



Корь - одна из самых заразных детских вирусных инфекций, которая нередко приводит к смерти или инвалидности детей.

Причиной большинства смертельных случаев становятся осложнения кори, которые чаще всего развиваются у детей до 5 лет и у взрослых старше 20 лет.

Возбудитель инфекции – вирус.

Инфекция передается воздушно-капельным путем во время разговора, чихания и кашля. Вирус содержится в капельках слюны и слизи.

90% людей, не имеющих иммунной защиты против кори, находясь рядом с больным заразятся.

Входные ворота инфекции - слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Далее вирус разносится кровью по всему организму.

Симптомы кори появляются через 7-14 дней после инфицирования человека.

Первые симптомы

- **лихорадка**
- **насморк**
- **кашель**
- **конъюнктивит**

Через 2 или 3 дня на слизистой оболочке щек появляются крошечные белые пятна окруженные каймой (пятна Филатова-Коплика).

Через 3-5 дней после появления первых симптомов появляется сыпь. Обычно она начинается с плоских красных пятен, которые появляются на лице у волос и распространяются вниз до шеи, туловища, рук и ног. В момент появления сыпи, лихорадка может достигать 39°C.

Через несколько дней, в среднем это 3-4 дня, лихорадка спадает, сыпь исчезает.

Среди осложнений кори - пневмония, синдром крупса, энцефалит (отек головного мозга), слепота, отит. Корь может усугубить течение туберкулеза.

Болеют корью и дети и взрослые. Наиболее тяжело корь протекает у ослабленных детей и у детей с иммунодефицитными состояниями.

После перенесенной кори формируется пожизненный иммунитет (невосприимчивость) к повторному заражению.

Профилактика кори

Единственной эффективной и длительной защитой ребенка от кори является вакцинация.

Защитить ребенка можно с помощью комбинированной вакцины, которая защищает от трех заболеваний: корь, паротит, краснуха.

В России вакцинация против кори проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах бесплатно.

Прививка делается детям в возрасте 1 года и в 6 лет. Если прививка не была проведена вовремя или если нет информации о прививках, то она проводится взрослым также в 2 этапа с разницей в 3 месяца.

Вакцина против кори безопасна и эффективна.



ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ КОРИ - ВАШ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ !